

Provisorischer Schlüssel zur Gattung *Sistotremastrum* in Deutschland
(nach Spirin et al. 2021- On *Sistotremastrum* and similar-looking taxa)

1a. Sporen 7-11 x 3,5-5,5 µm, alle Basidien 4-sporig	<i>S. vigilans</i>
1b. Sporen 5-9 x 2-4 µm, Basidien 4-6-sporig	2
2a. an Laubholz	3
2b. an Nadelholz	4
3a. Sporen 7-9 x 3-4 µm, Subikulum sehr dünn	<i>S. niveocreameum</i> = <i>Sertulicium niveocreameum</i>
3b. Sporen 5-7 x 2.5-3 (selten bis 3,5) µm, Subikulum gut ausgebildet	<i>S. guttuliferum</i> = <i>Sertulicium granuliferum</i>
4a. Sporen 5,5 - 8,5 x 3-4 µm, Basidiolen subglobos	<i>Sertulicium jacksonii</i>
4b. Sporen 4,5 - 7 x 2-3,5 µm, Basidiolen clavat	5
5a. Sporen 4,5-7 x 2,5-3,5 µm, meist an Picea, gut entwickelte Frk. mit deutlichen Hyphensträngen	<i>S. mendax</i>
5b. Sporen 4-6 x 2-3 µm, meist an Pinus, Hyphenstränge unauffällig	<i>S. suecicum</i>